

科名 皮膚科 皮膚-1(a)
 対象疾患名 乾癬
 プロトコール名 レミケード(初回、2週、6週) day98まで

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	15	...	43
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ					
2	静注	側管	デカドロン注	8mg	30分かけて	()	()	()		
	静注	側管	ガスター注	20mg						
3	静注	側管	生理食塩液	50mL	30分かけて	()	()	()		
			コ-ルリト注	10mg						
2	点滴注	側管	レミケード注	5mg / Kg	2時間以上かけて 専用ルート(フィルター付)使用					
			生食	250mL						

~ MEMO ~

- ・ 初回投与後、2週、6週に投与する。以後8週間の間隔で投与を行なうこと。
- ・ レミケードは専用ルート(フィルター付)を使用のこと。
- ・ タリオン20mgをレミケード投与2時間前に内服する。
- ・ 15分ごとと血圧測定後、点滴速度をあげていく。

2時間投与の場合

10mL/時 20mL/時 40mL/時 80mL/時 150mL/時で30分後 250mL/時で継続

3時間投与の場合

10mL/時 20mL/時 40mL/時 80mL/時 100mL/時で継続

- ・ 6ヶ月間は、終了後30分経過観察が必要。