

科名 皮膚科 皮膚-1(b)
 対象疾患名 乾癬
 プロトコール名 レミケード(8週ごと)day99以降

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 … 56
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ	
2	静注	側管	デカドロン注	8mg	30分かけて	()
	静注	側管	ガスター注 生理食塩液	20mg 50mL		
3	静注	側管	ケ-ルリト注 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	()
2	点滴注	側管	レミケード注 生食	5mg / Kg 250mL	2時間以上かけて 専用ルート(フィルター付)使用	

~ MEMO ~

- ・ 初回投与後、2週、6週に投与する。以後8週間の間隔で投与を行なうこと。
- ・ レミケードは専用ルート(フィルター付)を使用のこと。
- ・ タリオン20mgをレミケード投与2時間前に内服する。
- ・ 15分ごとと血圧測定後、点滴速度をあげていく。

2時間投与の場合

10mL/時 20mL/時 40mL/時 80mL/時 150mL/時で30分後 250mL/時で継続

3時間投与の場合

10mL/時 20mL/時 40mL/時 80mL/時 100mL/時で継続

- ・ 6ヶ月間は、終了後30分経過観察が必要。