

科名 外科
 対象疾患名 胃癌
 プロトコール名 S-1+middledoseCDDP

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 21 | 22 | ... | 35 |
|----|-----|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----|---|-----|----|-----|----|----|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン3-① | 生食 | 500mL | 制吐剤終了までルートキープ 残破棄可 | | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | |
| 2 | 点滴注 | 側管① | パロノセトロンバッグ デキサート | 0.75mg 9.9mg | 30分かけて | | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | |
| 3 | 点滴注 | メイン3-② | フィジオ140 | 500mL | 制吐剤終了後から 120分かけて | | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | |
| 4 | 点滴注 | 側管② | シスプラチン 生食 | 25mg/m ² 500mL | 120分かけて | | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | |
| 6 | 点滴注 | メイン3-③ | フィジオ140 ラシックス | 500mL 20mg | 60分かけて | | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | |
| 7 | 内服 | S-1 1回40~60mgを1日2回day1夕~21朝投与、day21夕~36朝は休薬 | | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

★1クール=35日

MEMO~

催吐レベル4(90%以上)

day8,15,22化学療法1時間前にイメンド125mg,その後2日間午前中に80mgを内服。

<S-1>

S-1は3週投与2週休薬

体表面積(BSA) < 1.25m²: 40mg/回

1.25m² ≤ BSA < 1.5m²: 50mg/回

BSA ≥ 1.5m²: 60mg/回