

科名 消化器科 消14  
 対象疾患 胃癌  
 プロトコール名 Weekly パクリタキセル

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	.....	8	.....	15	.....	22	.....	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液キット	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓		↓		↓				
2	静注	側管	デキサート注 ガモファー注 生理食塩液	6.6~19.8mg 20mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓				
3	静注	側管	ネオレスタール注 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて	↓		↓		↓				
4	点滴注	側管	パクリタキセル注 生理食塩液	80mg/m <sup>2</sup> 250mL	1時間かけて 専用ルート使用 ※壊死性抗癌剤	↓		↓		↓				

★1クール=28日 3投1休

～MEMO～

- ・催吐レベル2(30～10%)
- ・タキソールはアルコール含有。アルコールアレルギーを確認する。
- ・タキソールはPVCフリーかつフィルター付きのものを使用。
- ・禁忌:薬剤アレルギーの既往の多い症例
- ・アレルギー対策:初回デキサート増量(13.2mg)
- ・初回、2回まではアレルギーの出現に注意。
- ・タキソール投与開始から10分間はベッドサイドを離れない。
- ・薬剤の特徴により1mL=20滴とならないため滴下数を1.6倍にすること。  
(1hrで滴下する場合136滴/分)