

科名 消化器科 消化39(b)
 対象疾患名 肝がん
 プロトコール名 アイエーコール+リピオドール(サスペンション動注)

R p	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	...	15	...	28
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 全て投与							
2	点滴注	側管	ソルデム1	500mL	2時間かけて							
3	点滴注	側管	プロイメンド 生食	150mg 100mL	30分かけて							
4	点滴注	側管	グラニセトロン デキサート	3mg 9.9mg	30分かけて							
5	肝動注	メイン	アイエーコール リピオドール	65mg/m ² 20mL	20～40分かけて							
6	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて							
7	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて							
8	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて							
9	点滴注	メイン	ソルデム1	500mL	2時間かけて							

1クール = 28日

～ MEMO ～

< 腎障害軽減のため >

投与時から投与終了後1500～3000mLの適当な輸液を6時間以上かけて投与する。

尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

< 調製 >

アイエーコールを速やかに溶解するため調製時には湯浴(約50度)で加温したリピオドールを加えて強く振り混ぜる。

アイエーコール100mg1V+リピオドール20mL(そのうち採取可能は約18mL)を20mLのロック式シリンジで調製する。