

科名 消化器科 消化器49(b)
 対象疾患 胃がん
 プロトコール名 SOX(胃癌)(アロカリス併用)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	14	...	21
1	点滴注 CV	メイン	生食	500mL	ラインキープ 残破棄可	↓				
2	点滴注 CV	側管	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート ファモチジン ネオレスタール注	0.75mg 235mg 4.95mg 20mg 10mg	30分かけて	↓				
3	点滴注 CV	側管	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	100mg/m ² 250mL又は500mL	2時間かけて ルートごと変更	↓				

内服 S-1 1回40mg～60mgを1日2回 d1～d14投与、d15～d21は休薬

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

<S-1>

14日間投与、7日間休薬

・体表面積(BSA) < 1.25m²: 40mg/回

1.25m² ≤ BSA < 1.5m²: 50mg/回

BSA ≥ 1.5m²: 60mg/回

<オキサリプラチン>

・必ず5%ブドウ糖液で希釈。(薬効がおちる。)

・アレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。

(現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)

・デキサートは6.6、9.9、13.2、19.8mgで選択可。