

科名 消化器科
 対象疾患名 クローン病
 プロトコール名 IFX(クローン病)(4回目以降)10mg 56日ごと

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ... 56
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄	↓
2	点滴注	側管	生食	50mL	30分かけて	↓
			デキサート	6.6mg		
			ネオレスタール	10mg		
			ファモチジン	20mg		
3	点滴注	側管	インフリキシマブ	10mg/kg	医師の指示通り	↓
			生食	250mL	要フィルター JY-PF340P52使用	

★1クール=56日

～MEMO～

5mg/kg投与で効果が減弱した際には10mg/kgまで増量可

1.2ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること。

(回路名: JY-PF340P52 フィルター付きPVCフリー回路)

輸液ポンプを使用し、投与速度は50mL/hで開始し、30分後125mL/hにする。

治療開始3回目までは投与後30分は経過観察をし、以降副作用が見られなければ帰宅可

投与開始前、30分後、60分後、終了時に血圧を測定すること。

効果が減弱した際には10mg/kgまで増量可

<調製方法>

21Gあるいはさらに細い針を用いて1Vあたり10mLの生食を静かに注入する。