

科名 消化器科

対象疾患名 潰瘍性大腸炎

プロトコール名 IFX(潰瘍性大腸炎)(1回目～3回目)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	15	43	...	98
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキーブ 残破棄	↓		↓			↓		
2	点滴注	側管	生食	50mL	30分かけて	↓		↓			↓		
			デキサート	6.6mg									
			ネオレスタール	10mg									
			ファモチジン	20mg									
3	点滴注	側管	インフリキシマブ	5mg/kg	医師の指示通り	↓		↓			↓		
			生食	250mL	要フィルター JY-PF340P52使用								

★1クール=98日

～MEMO～

1.2ミクロン以下のインラインフィルターを使用すること。

(回路名: JY-PF340P52 フィルター付きPVCフリー回路)

輸液ポンプを使用し、投与速度は50mL/hで開始し、30分後125mL/hにする。

治療開始3回目までは投与後30分は経過観察をし、以降副作用が見られなければ帰宅可

投与開始前、30分後、60分後、終了時に血圧を測定すること。

<調製方法>

21Gあるいはさらに細い針を用いて1Vあたり10mLの生食を静かに注入する。