

科名 消化器

対象疾患名 HER2陽性の胃癌

プロトコール名 HER+mFOLFOX6(初回)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	15	...	22	...	29	...	42
1	CVポート	メイン3-①	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓			↓		↓		↓		
2	CVポート	側管①	パロノセトロンパッグ アロカリス ファモチジン ボラミン デキサート	0.75mg 235mg 20mg 5mg 4.95mg	30分かけて	↓			↓				↓		
3	CVポート	側管②	トラスツズマブ 生食	8mg/kg 250mL	初回90分。以降忍容性があれば30分。 ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性あれば30分。	↓									
4	CVポート	側管	トラスツズマブ 生食	6mg/kg 250mL	初回90分。以降忍容性があれば30分。 ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性あれば30分。						↓				
5	CVポート	メイン3-②	レボホリナート注 5%ブドウ糖液	200mg/m2 250mL	2時間かけて	↓			↓				↓		
6	CVポート	側管③	オキサリプラチン注 5%ブドウ糖液	85mg/m2 250mL	2時間かけて	↓			↓				↓		
7	CVポート	側管④	フルオロウラシル注 5%ブドウ糖液	400mg/m2 50mL	急速静注 3～5分	↓			↓				↓		
8	CVポート	メイン3-③	フルオロウラシル注 生理食塩液	2400mg/m ² mL※	46時間持続静注 シユアフューザーAにて調製	↓			↓				↓		

1クール=42日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2-4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

<トラスツズマブ>

初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg。初回90分で忍容性があれば2回目以降30分。ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性あれば30分。

禁忌: アンスラサイクリン系との併用(心毒性の増強)

初回投与の40%にインフュージョンリアクションが認められる。投与開始後2時間は慎重に観察

三か月毎に心エコーで心機能を評価

投与予定日から1週以上経過した場合は初回投与量(8mg/kg)より再開する。

<オキサリプラチン>

【注1】オキサリプラチンは必ず5%ブドウ糖で希釈。(薬効がおちる。)

【注2】デキサート注は6.6～19.8mgで選択可。

【注3】オキサリプラチンのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。
(現在は4～16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)