

科名 消化器

対象疾患名 HER2陽性の胃癌

プロトコール名 HER+mFOLFOX6(2回目以降)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	…	15	…	22	…	29	…	42
1	CVポート メイン3-①		生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓	…	↓	…	↓	…	↓	…	↓
2	CVポート 側管①	パロノセトロンバッグ	0.75mg		30分かけて	↓	↓	…	↓	…	↓	…	↓	…	↓
		アロカリス	235mg												
		ファモチジン	20mg												
		ポララミン	5mg												
		デキサート	4.95mg												
3	CVポート 側管②	トラスツズマブ	6mg/kg		初回90分。以降忍容性があれば30分。	↓		…	↓	…	↓	…	↓	…	↓
		生食	250mL		ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性あれば30分。										
4	CVポート メイン3-②	レボホリナート注	200mg/m ²		2時間かけて	↓	↓	…	↓	…	↓	…	↓	…	↓
		5%ブドウ糖液	250mL												
5	CVポート 側管③	オキサリプラチニ注	85mg/m ²		2時間かけて	↓	↓	…	↓	…	↓	…	↓	…	↓
		5%ブドウ糖液	250mL												
6	CVポート 側管④	フルオロウラシル注	400mg/m ²		急速静注	↓	↓	…	↓	…	↓	…	↓	…	↓
		5%ブドウ糖液	50mL		3~5分										
7	CVポート メイン3-③	フルオロウラシル注	2400mg/m ²		46時間持続静注	↓	↓	…	↓	…	↓	…	↓	…	↓
		生理食塩液	mL [*]		シェアフューザーAにて調製										

1クール=42日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

day2~4にデカドロン朝、昼食後に1回4mg(8錠)を内服する。

<トラスツズマブ>

初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg。初回90分で忍容性があれば2回目以降30分。ただし、初回にインフュージョンリアクションあれば2回目60分。以降忍容性あれば30分。

禁忌：アンスラサイクリン系との併用(心毒性の増強)

初回投与の40%にインフュージョンリアクションが認められる。投与開始後2時間は慎重に観察

三ヶ月毎に心エコーで心機能を評価

投与予定日から1週以上経過した場合は初回投与量(8mg/kg)より再開する。

<オキサリプラチニ>

【注1】オキサリプラチニは必ず5%ブドウ糖で希釈。(薬効がおちる。)

【注2】デキサート注は6.6~19.8mgで選択可。

【注3】オキサリプラチニのアレルギー反応は他の薬剤と出現形態が違うので注意する。

(現在は4~16クール目、投与30分経過後に出現することが多いと報告されている。2007.10)