

科名 血液内科 血内-1

対象疾患名 悪性リンパ腫

プロトコール名 CHOP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	21
1	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓						
			プレドニゾン注	10~100mg								
			又は									
3	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ	0.75mg	30分かけて							
			プレドニゾン注	10~100mg								
4	点滴注	側管	ドキシソルビシン注	50mg/m ²	30分かけて	↓						
			生理食塩液	100mL	※壊死性抗癌剤							
5	点滴注	側管	オンコピン	1.4mg/m ²	30分かけて	↓						
			生理食塩液	100mL	※壊死性抗癌剤 フィルター使用不可							
6	点滴注	側管	エンドキサン注	750mg/m ²	原則3時間かけて	↓						
			生理食塩液	500mL								
7	点滴注	側管	プレドニゾン注	10~100mg	15分かけて		↓	↓	↓	↓		
			5%ブドウ糖液	50mL								
8		経口	プレドニゾン	10~100mg		↓	↓	↓	↓	↓		

★1クール=21日

~MEMO~

<オンコピン>

最大投与量2mg

フィルター使用不可

・ 内服不能の場合、プレドニゾロンは点滴注