

科名 血液内科
 対象疾患名 移植前処置
 プロトコール名 CY/TBI

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1			TBI					↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	CV	側管	グラニセトロンバッグ アロカリス	1mg 235mg	30分かけて	↓	↓						
3	CV	側管	エンドキサン 生理食塩液	60mg/kg 500mL	3時間かけて	↓	↓						
4	CV	側管	ウロミテキサン 5%ブドウ糖液	24mg/kg 50mL	30分かけて エンドキサン投与時	↓	↓						
5	CV	側管	ウロミテキサン 5%ブドウ糖液	24mg/kg 50mL	30分かけて エンドキサン投与 4時間後	↓	↓						
6	CV	側管	ウロミテキサン 5%ブドウ糖液	24mg/kg 50mL	30分かけて エンドキサン投与 8時間後	↓	↓						
7			移植										↓

1コース=8日間

～MEMO～

催吐リスク(90%以上)

エンドキサン 高齢者減量

全身放射線照射の都合でエンドキサンの投与日は変更となる

ウロミテキサンは、エンドキサンの40%量を1回量とする。