

科名 血液内科 血30
 対象疾患名 急性骨髄性白血病
 プロトコール名 AML201-C

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----|-----|----------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | CV | 側管 | グラニセトロンバッグ ソルコーテフ | 1mg 100mg | 30分かけて | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 2 | CV | 側管 | キロサイド 5%ブドウ糖 | 2000mg/m ² 500mL | 3時間かけて 朝 12時間毎 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 3 | CV | 側管 | ソルコーテフ 5%ブドウ糖 | 100mg 50mL | 30分かけて | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 4 | CV | 側管 | キロサイド 5%ブドウ糖 | 2000mg/m ² 500mL | 3時間かけて 夕 12時間毎 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |

～MEMO～

催吐リスク3(30%以上90%未満)

キロサイド1日2回投与

地固め療法として3コース行う

フルメロン点眼併用