

科名 血液内科 血36  
 対象疾患名 急性リンパ性白血病  
 プロトコール名 ALL202-U-Consolidation

Rp	形態	ルート	薬剤名	単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	28
1	点滴	側管	グラニセトンバッグ	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓				
2	点滴	側管	ピノルビン	25mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて	↓	↓														
			5%ブドウ糖	100mL	壊死性抗がん剤																
3	点滴	側管	エンドキサン	750mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて	↓							↓								
			生理食塩液	250mL																	
4	点滴	側管	キロサイド	75mg/m <sup>2</sup>	1時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓			
			5%ブドウ糖	100mL																	
	経口		ロイケリン散	50mg/m <sup>2</sup>	1日1回 眠前	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	髄注					↓							↓								

1クール=28日間

～MEMO～

day1,8に髄注(MTX 12mg+ AraC 30mg+ハイドロコトシ 25mg)を行う。

<ロイケリン散>

day1-14に、ロイケリン散 50mg/m<sup>2</sup>を1日1回 眠前に内服する。

フェブリクは併用禁忌、アロプリノール服用時はロイケリン散を半量に減量する