

科名 血液内科 血37  
 対象疾患名 急性リンパ性白血病  
 プロトコール名 ALL202-U-Sanctuary

Rp	形態	ルート	薬剤名	単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	点滴	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓							↓						
2	点滴	側管	メソトレキセート	3g/m <sup>2</sup>	24時間持続	↓							↓						
			生理食塩液	500mL															
3	点滴	側管	ロイコホリン	15mg/m <sup>2</sup>	30分かけて			↓	↓						↓	↓			
			生理食塩液	50mL	4時														
4	点滴	側管	ロイコホリン	15mg/m <sup>2</sup>	30分かけて			↓	↓						↓	↓			
			生理食塩液	50mL	10時														
5	点滴	側管	ロイコホリン	15mg/m <sup>2</sup>	30分かけて			↓							↓				
			生理食塩液	50mL	16時														
6	点滴	側管	ロイコホリン	15mg/m <sup>2</sup>	30分かけて			↓							↓				
			生理食塩液	50mL	22時														
			髄注					↓						↓					

1クール=14日間

～MEMO～

day2,9に髄注(MTX 12mg+ AraC 30mg+ハイドロコルチン 25mg)を行う。

<メソトレキセート>

十分な輸液(100-150mL/hまたは100mL/m<sup>2</sup>/h)、メイロン、ダイアモックス投与を行い、尿量を3000mL/day以上、尿pH7.0以上に保つ。

バクタは72時間以上前から休業する

ロイコホリンスキュー必須。1回目投与はMTX開始より42時間後とし、6時間毎に6回投与する。

口内炎注意。ロイコホリン含嗽を検討。