

科名 血液内科
 対象疾患名 急性リンパ性白血病
 プロトコール名 ALL202-U-Reinduction

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	投与時間・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	...	28
1	点滴	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓							↓											↓
2	点滴	側管	オンコビン	1.5mg/m ²	30分かけて	↓							↓											↓
			生理食塩液	100mL	壊死性抗がん剤																			
3	点滴	側管	ピノルビン	25mg/m ²	1時間かけて	↓							↓											
			5%ブドウ糖液	100mL	壊死性抗がん剤																			
4	点滴	側管	エンドキサン	500mg/m ²	1時間かけて	↓							↓											
			生理食塩液	250mL																				
5	筋注		ロイナーゼ	6000U/m ²		↓		↓		↓			↓		↓		↓							
			5%ブドウ糖液	2mL																				
	経口		プレドニン	40mg/m ²	分3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	経口		プレドニン	10mg/m ²																				↓ ↓ ↓
	髄注					↓																		

1クール=28日

～MEMO～

催吐リスク3(30-90%)

day1に髄注(MTX 12mg+ AraC 30mg+ハイドロコトシ 25mg)を行う。

オンコビン Max = 2 mg

day1-14にプレドニン 40mg/m²/日を内服する。Day15以降は、10mg/m²/日を3日間内服として中止する。