

科名 血液内科
 対象疾患名 急性リンパ性白血病
 プロトコール名 ALL-O-Induction

Rp 形態レート	薬剤名	単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	CV 側管	グラニセトロンバッグ アロカリス	1mg 235mg	30分かけて	↓																											
1	CV 側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓	↓				↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
2	CV 側管	エンドキサン 生理食塩液	1200mg/m ² 250mL	3時間かけて	↓																											
3	CV 側管	ダウノマイシン 生理食塩液	60mg/m ² 100mL	1時間かけて 壊死性抗がん剤	↓	↓	↓																									
4	CV 側管	オンコピン 生理食塩液	1.3mg/m ² 50mL	30分かけて 壊死性抗がん剤 フィルター使用不	↓					↓							↓														↓	
5	CV 側管	ロイナーゼ 5%ブドウ糖液	3000U/m ² 250mL	3時間かけて 初回ブリックテストを行う。								↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
6	CV 側管	プレドニゾン注 5%ブドウ糖液	60mg/m ² 50mL	30分かけて 内服でも可	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
7	CV 側管	プレドニゾン注 5%ブドウ糖液	50mg/body 50mL	30分かけて 内服でも可																											↓	
8	CV 側管	プレドニゾン注 5%ブドウ糖液	40mg/body 50mL	30分かけて 内服でも可																											↓	
9	CV 側管	プレドニゾン注 5%ブドウ糖液	30mg/body 50mL	30分かけて 内服でも可																											↓	
10	CV 側管	プレドニゾン注 5%ブドウ糖液	20mg/body 50mL	30分かけて 内服でも可																											↓	
11	CV 側管	プレドニゾン注 5%ブドウ糖液	10mg/body 50mL	30分かけて 内服でも可																											↓	↓
12	CV 側管	プレドニゾン注 5%ブドウ糖液	5mg/body 50mL	30分かけて 内服でも可																											↓	

～MEMO～

催吐リスク3(30%以上90%未満)

<オンコピン>

最大投与量2mg

フィルター使用不可

ロイナーゼ初回投与時はアレルギーチェックをすること

調製方法

溶解には注射用水、または5%ブドウ糖液を使用し、1Vあたり2～5mLで溶解する
 生理食塩液で直接溶解すると、白濁することがあるため、溶解には使用しない
 溶解後3時間以上経過時に浮遊物を認めるため、溶解後は速やかに使用すること
 プレドニゾンは、内服でも可。1週間程度かけて漸減後終了すること。