

科名 血液内科

対象疾患名 急性リンパ性白血病

プロトコール名 ALL202-C2-A

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CV	側管	グラニセトロンバッグ アロカリス	1mg 235mg	30分かけて	↓															↓					
2	CV	側管	メソトレキセート 5%ブドウ糖液	3000mg/m ² 500mL	持続点滴 24時間	↓															↓					
3	CV	側管	オンコビン 生理食塩液	1.3mg/m ² 50mL	30分かけて 壊死性抗がん剤 フィルター使用不可	↓															↓					
4	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m ² 50mL	30分かけて 4時			↓	↓													↓	↓			
5	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m ² 50mL	30分かけて 10時			↓	↓													↓	↓			
6	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m ² 50mL	30分かけて 16時			↓	↓													↓	↓			
7	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	50mg 50mL	30分かけて 22時			↓														↓				
8	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m ² 50mL	30分かけて 22時			↓														↓				
9	経口		ロイケリン散	25mg/m ²	1日1回 眠前	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
10	髄注					↓															↓					

～MEMO～

催吐リスク3(30%以上90%未満)

オンコビン Max = 2 mg

50歳以上は、メソトレキセートを1.5g/m²に減量する。

ロイケリン散を、25mg/m² 1日1回 眠前に day1-21 に内服する。

髄注 メソトレキセート 15mg +デキサート注 3.3mg をday1 と day15に行う