

科名 血液内科

対象疾患名 急性リンパ性白血病

プロトコール名 ALL202-C2-B

Rp	形態	ルート	薬剤名	単位		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CV	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて																					
2	CV	側管	メソトレキセート 5%ブドウ糖液	100mg/m <sup>2</sup> 250mL	2時間かけて																					
2	CV	側管	メソトレキセート 5%ブドウ糖液	400mg/m <sup>2</sup> 500mL	22時間かけて																					
3	CV	側管	オンコビン 生理食塩液	1.3mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 壊死性抗がん剤 フィルター使用不可																					
4	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg 50mL	30分かけて 4時																					
5	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg 50mL	30分かけて 10時																					
6	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg 50mL	30分かけて 16時																					
7	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg 50mL	30分かけて 22時																					
8	経口		ロイケリン散	25mg/m <sup>2</sup>	1日1回 眠前																					
9	髄注																									

～MEMO～

催吐リスク3(30%以上90%未満)

オンコビン Max = 2 mg

ロイケリン散 25mg/m<sup>2</sup> 1日1回 眠前 を day1-21に内服する。

髄注 メソトレキセート15mg +デキサート注 3.3mgを day1、15に行う。