

科名 血液内科
 対象疾患名 急性リンパ性白血病
 プロトコール名 ALL202-C3

Rp 形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	CV 側管	グラニセロン注バッグ	1mg	30分かけて	↓							↓							↓							
2	CV 側管	オンコビン	1.3mg/m ²	30分かけて	↓							↓							↓							
		生理食塩液	50mL	壊死性抗がん剤 フィルター使用不可																						
3	CV 側管	ドキシソルビシン	30mg/m ²	30分かけて	↓							↓							↓							
		生理食塩液	50mL	壊死性抗がん剤																						
4	CV 側管	デキサート	8.25mg/m ²	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		5%ブドウ糖液	50mL																							
8	髄注				↓																					

Rp 形態	ルート	薬剤名			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1	CV 側管	グラニセロン注バッグ	1mg	30分かけて								↓													
5	CV 側管	エンドキサン	1000mg/m ²	3時間かけて								↓													
		生理食塩液	250mL																						
6	CV 側管	キロサイド	75mg/m ²	1時間かけて								↓	↓	↓	↓	↓			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		5%ブドウ糖液	250mL																						
7	経口	ロイケリン	60mg/m ²	1日1回 眠前								↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
8	髄注											↓													

～MEMO～

催吐リスク3(30%以上90%未満)

<オンコビン>

最大投与量2mg

フィルター使用不可

ロイケリン散 25mg/m² 1日1回 眠前を day29-42 に内服

髄注 メソトレキセート15mg +デキサート注 3.3mg +キロサイド 40mg/body をday1、29 に行う