

科名 血液内科
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 プロトコール名 MEAM+PBSCT

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1	CV	側管	グラニセトロンパック	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
2	CV	側管	サイメリン	300mg/m ²	30分かけて	↓							
			生理食塩液	100mL	壊死性抗がん剤								
3	CV	側管	エトポシド	200mg/m ²	3時間かけて シリンジポンプで 輸液セット注意 壊死性抗がん剤		↓	↓	↓	↓			
4	CV	側管	ソル・コーテフ	100mg	15分かけて				↓	↓			
			5%ブドウ糖	50mL	キロサイド投与前								
5	CV	側管	キロサイド	2000mg/m ²	3時間かけて				↓	↓			
			5%ブドウ糖	500mL	朝								
6	CV	側管	ソル・コーテフ	100mg	15分かけて				↓	↓			
			5%ブドウ糖	50mL	キロサイド投与前								
7	CV	側管	キロサイド	2000mg/m ²	3時間かけて				↓	↓			
			5%ブドウ糖	500mL	夕								
8	CV	側管	アルケラン	140mg/m ²	30分かけて						↓		
			生理食塩液	100mL	調整後90分以内に 投与終了								
			幹細胞移植										↓
			リツキサン	375mg/m ²	静注								day 28, 35

～MEMO～

キロサイド1日2回投与

アルケランは、調整後90分以内に投与を終了すること。

リツキサンをday28、35に投与する。(オーダーは血内5を使用して入力)