

科名 血液内科 血76  
 対象疾患名 悪性リンパ腫  
 プロトコール名 DHAP(シスプラチン)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	21
1	点滴注	側管	デキサート注 グラニセトロン アロカリス	33mg 1mg 235mg	30分かけて	↓					
2	点滴注	側管	シスプラチン 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	24時間持続静注 要遮光	↓					
3	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	33mg 50mL	30分かけて		↓	↓	↓		
4	点滴注	側管	グラニセトロン	1mg	30分かけて	↓					
5	点滴注	側管	キロサイド 5%ブドウ糖液	2000mg/m <sup>2</sup> 500mL	シスプラチン終了後 3時間かけて 朝 12時間毎	↓					
6	点滴注	側管	ソルコーテフ 5%ブドウ糖液	100mg 50mL	キロサイド前 30分かけて	↓					
7	点滴注	側管	キロサイド 5%ブドウ糖液	2000mg/m <sup>2</sup> 500mL	3時間かけて 夕 12時間毎	↓					

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

・day3-4のデキサートは、デカドロン錠40mgの内服でも可。

・3～4週毎に繰り返す

<シスプラチン>

・CDDP投与前に輸液負荷1000mL～2000mL、CDDP投与後輸液負荷1000mL

・CDDPの減量規定

Cre 1.5-2.0 mg/mL→75mg/m<sup>2</sup>

Cre 2.1-3.0 mg/mL→50mg/m<sup>2</sup>

<キロサイド>

・71歳以上は1000mg/m<sup>2</sup>に減量

・フルメトロン点眼併用