

科名 血液内科
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 プロトコール名 HyperCVAD course2

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4
1	CV	側管	グラニセトンバック	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	
2	CV	側管	ソルメドロール 5%ブドウ糖液	40mg/body 50mL	30分かけて 12時間毎	↓	↓	↓	
3	CV	側管	メソトレキセート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 100mL	2時間かけて 10時	↓			
4	CV	側管	メソトレキセート 5%ブドウ糖液	800mg/m ² 500mL	22時間かけて 12時	↓			
5	CV	側管	キロサイド 5%ブドウ糖液	3000mg/m ² 500mL	3時間かけて 12時間毎		↓	↓	
6	CV	側管	ソルメドロール 5%ブドウ糖液	40mg/body 50mL	30分かけて	↓	↓	↓	
7	CV	側管	キロサイド 5%ブドウ糖液	3000mg/m ² 500mL	3時間かけて 12時間毎		↓	↓	
8	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	50mg 50mL	30分かけて 22時		↓		
9	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 4時			↓	↓
10	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 10時			↓	↓
11	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 16時			↓	↓
12	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 22時			↓	↓

～MEMO～

催吐リスク3(30%以上90%未満)

キロサイド1日2回投与

day 1-3にソルメドロール40mg/body x2/dayを投与することが望ましい

キロサイド投与中はフルメロン点眼を行う

60歳以上はキロサイドを減量する