

科名 血液内科
 対象疾患名 悪性リンパ腫
 プロトコール名 R+HyperCVAD/MA course2

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5
1	CV	側管	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m ² 500mL		↓				
2	CV	側管	グラニセトロンパック	1mg	30分かけて		↓	↓	↓	
3	CV	側管	メソトレキセート 5%ブドウ糖液	200mg/m ² 100mL	2時間かけて 10時		↓			
4	CV	側管	メソトレキセート 5%ブドウ糖液	800mg/m ² 500mL	22時間かけて 12時		↓			
5	CV	側管	ソル・コーテフ 5%ブドウ糖液	100mg/body 50mL	30分かけて 12時間毎			↓	↓	
6	CV	側管	キロサイド 5%ブドウ糖液	3000mg/m ² 500mL	3時間かけて 12時間毎 朝			↓	↓	
7	CV	側管	ソル・コーテフ 5%ブドウ糖液	100mg/body 50mL	30分かけて 12時間毎			↓	↓	
8	CV	側管	キロサイド 5%ブドウ糖液	3000mg/m ² 500mL	3時間かけて 12時間毎 夕			↓	↓	
9	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	50mg 50mL	30分かけて 22時			↓		
10	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 4時				↓	↓
11	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 10時				↓	↓
12	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 16時				↓	↓
13	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	12mg/m ² 50mL	30分かけて 22時				↓	

1クール=4日間

～MEMO～

- 催吐リスク(90%以上)
- キロサイド1日2回投与
- キロサイド投与中はフルメトロン点眼を行う
- 60歳以上はキロサイドを減量する
- day1のリツキシマブは、後日投与でも可。オーダーは血内5を使用。