

科名 血液内科 血86(1)
 対象疾患名 成人T細胞白血病/悪性リンパ腫
 プロトコール名 LSG-15(day1, 8)VCMP療法・AMP療法

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | コメント | 1 | ... | 8 | ... | 14 |
|----|--------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|---|-----|----|
| 1 | 点滴注・CV | メイン | ソルデム1 | 500mL | ルートキープ 残ハキ可 | ↓ | | ↓ | | |
| 2 | 点滴注・CV | 側管 | グラニセトロンバッグ | 1mg | 30分かけて | ↓ | | ↓ | | |
| | | | プレドニゾン注 | 40mg/m ² | | | | | | |
| 3 | 点滴注・CV | 側管 | ドキシソルビシン | 40mg/m ² | 30分かけて | ↓ | | | | |
| | | | 生理食塩液 | 100mL | 壊死性抗がん剤 | | | | | |
| 4 | 点滴注・CV | 側管 | オンコビン | 1mg/m ² | 30分かけて | ↓ | | | | |
| | | | 生理食塩液 | 100mL | ※依リエハシ留リ フィルター使用不可 | | | | | |
| 5 | 点滴注・CV | 側管 | エンドキサン | 350mg/m ² | 2時間かけて | ↓ | | | | |
| | | | 生理食塩液or ソルデム3A | 500mL | | | | | | |
| 6 | 点滴注・CV | 側管 | ドキシソルビシン | 30mg/m ² | 30分かけて | | | ↓ | | |
| | | | 生理食塩液 | 100mL | 壊死性抗がん剤 | | | | | |
| 7 | 点滴注・CV | 側管 | サイメリン | 60mg/m ² | 30分かけて | | | ↓ | | |
| | | | 生理食塩液 | 100mL | | | | | | |

★1クール=28日 day15以降はLSG-15(day15-17)へ続く

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

LSG-15はday1:VCAP、day8:AMP、day15-17:VECP(要入院)

day15以降は血内86(2) LSG-15(day15-17)へ続く

<オンコビン>

最大投与量2mg

フィルター使用不可