

科名 血液内科 血内113

対象疾患名 再発難治CD33陽性急性骨髄性白血病

プロトコール名 マイロターゲット単剤

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	…	15
1	点滴注	側管	グラニセトロンパック	3mg/100mL	30分かけて			
2	点滴注	側管	マイロターゲット注 生理食塩液	9mg/m ² 100mL	2時間かけて 40~50mL/時 で			
3	点滴注	側管	生理食塩液	50mL	フラッシュ用 40~50mL/時 で			

MEMO~

- ・マイロターゲットは遮光下で1Vに注射用水5mLを加え、泡立てないように静かに回転させながら溶解し、1mg/mLとし、必要量を生食100mLで希釈する。
- ・マイロターゲット投与に際し、専用ルートを使用すること。(専用ルートは臨床工学課に請求する。) また、同一の点滴ルートで他の薬剤を使用しないこと。
- ・マイロターゲット投与30分前にボララミン(2)1錠、アセトアミノフェン0.5gを投与する。
- ・投与前から投与終了4時間までモニタリングする。
- ・14日間の投与間隔で2回まで投与可
- ・極めて高価な薬(20万円以上/V)なので、取り扱い注意！！