

科名 血液内科  
 対象疾患名 治療不応性急性白血病  
 プロトコール名 FLAG

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	0	1	2	3	4	5	...	...	...
	持続静注		GCS-F	5 $\mu$ g/kg	持続静注	↓	↓	↓	↓	↓	↓	好中球>500/ $\mu$ Lまで		
1	点滴注	側管	グラニセトンバッグ	1mg	30分かけて		↓	↓	↓	↓	↓			
2	点滴注	側管	フルダラ	25mg/m <sup>2</sup>	30分かけて		↓	↓	↓	↓	↓			
			注射用水	2.5mL										
			生食	100mL										
			3.5時間あける											
3	点滴注	側管	キロサイド	2000mg/m <sup>2</sup>	4時間かけて		↓	↓	↓	↓	↓			
			ソルコーテフ	100mg	フルダラの4時間後に投与									
			5%ブドウ糖	500mL										

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

治療中及び直後の期間、G-CSFはWBC>30,000/ $\mu$ Lで中断。20000/ $\mu$ L未満再開

フルダラはキロサイド開始4時間前に30分で投与。キロサイド4時間で投与