科名　血液内科　血内ー115

対象疾患名　MLL or 11q23転座例

プロトコール名　MLLプロトコール1

| Rp | 形態 | ルート | 薬剤名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点滴注 | 側管 | グラニセトロンバッグ | 1mg | 30分かけて<br>9:30～10:00 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | ロイナーゼ | 4000IU/㎡ | 3時間かけて | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | ↓ | | ↓ | | | | | | | | | |
| | or筋注 | | 5%ブドウ糖 | 250mL | 初回はプリックテスト 10:00～13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴注 | 側管 | エンドキサン | 500mg/㎡ | 2時間かけて | | | | | | | | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | |
| | | | 生理食塩液 | 500mL | 13:00～15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 点滴注 | 側管 | オンコビン | 1.4mg/㎡ | 30分かけて<br>22:00～22:30 | | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | |
| | | | 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 経口 | | プレドニゾロン | 40mg/㎡ | | | | | | | | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | day30～7日間で漸減 | | | | | | | |

～MEMO～

オンコビン MAX＝2mg

day8の末梢血、骨髄のblastが治療前の3倍以上に増加した場合中断とする

ロイナーゼはDIV or IM

オンコビン、ロイナーゼはGr3以上のAST,ALT上昇もしくはT-bil>2.0で中止。

FIB>150を保つ

臨床血液 31:320-324.1990、38:135-141.1997、40:709.1999 他