

科名 血液内科 血117

対象疾患名 再生不良性貧血移植前処置

プロトコール名 Flu+CY+ATG

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	
1	点滴注	CV	グラニセロンパック	1mg	30分かけて			↓	↓	↓	↓	↓									
2	点滴注	CV	エンドキサン 生食	600mg/m ² 250mL	1時間かけて				↓	↓	↓	↓									
3	点滴注	CV	フルダラ 注射用水 生理食塩液	30mg/m ² 2.5mL 100mL	1時間かけて				↓	↓	↓	↓									
4	点滴注	CV	ソル・メルコート 生理食塩液	2mg/Kg 50mL	サイモグロブリン投与1時間前 30分かけて			↓	↓	↓	↓	↓									
5	点滴注	CV	サイモグロブリン注 注射用水 生理食塩液	3.75mg/kg 5mL 500mL	12時間かけて 要フィルター			↓	↓	↓	↓	↓									
6	点滴注	CV	ソル・メルコート 生理食塩液	80mg 50mL	30分かけて								↓	↓							
7	点滴注	CV	ソル・メルコート 生理食塩液	40mg 50mL	30分かけて										↓	↓					
8	点滴注	CV	プレドニゾン 生理食塩液	20mg 50mL	30分かけて													↓	↓		
9	点滴注	CV	プレドニゾン 生理食塩液	10mg 50mL	30分かけて															↓	↓

～MEMO～

・メスナは投与しない。

〈サイモグロブリン〉

・試験投与

投与初日は試験投与を行う。

①1vを注射用水5mLに溶解し、このうち 0.5mLをとる。

②①を生食 100mLに希釈し、1時間以上かけて投与。

・アナフィラキシー予防

投与1時間前にアセアミノフェン 0.5g/回、ホ^ララミン錠 2mg/回の内服を行う。

途中アレルギー^キ-症状あれば再度追加検討。