

科名 血液内科 血129  
 対象疾患名 非ホジキンリンパ腫  
 プロトコール名 ACOMP - B療法

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	...	8	...	15	...	28
1	点滴注	側管	グラニセトロンパ'ッグ	3mg/100mL	30分かけて									
2	点滴注	側管	エンドキサン ソルデム3A	600mg/m <sup>2</sup> 500mL	2時間かけて									
3	点滴注	側管	ドキシソルピシン 生理食塩液	40mg/m <sup>2</sup> 100mL	30分かけて									
4	点滴注	側管	オンコピン 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 100mL	30分かけて									
5	持続点滴	側管	ブレオ 生理食塩液	8mg/m <sup>2</sup> 100mL	30分かけて									
6	点滴注	側管	メソトレキセート 生理食塩液	400mg/m <sup>2</sup> 500mL	2時間かけて									
7	内服		プレドニン	40mg/m <sup>2</sup>	day1～day7									

1クール=28日

～MEMO～

- ・治療サイクル: 4週間ごと
- ・オンコピン Max = 2mg
- ・ブレオ Max = 15mg/body
- ・day8メソトレキセート投与中は2,000mL以上の十分な補液とアルカリ化を行なう。
- ・メソトレキセート投与開始6時間後から、ロイコボリン15mgを6時間ごとに計11回筋注もしくは点滴静注する。