

科名 血液内科 血130(b)

対象疾患名 移植前処置

プロトコール名 FL+IV-BU(1日1回)+TBI

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1	CV	側管	グラニセトンバッグ	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
2	CV	側管	フルダラ注	30mg/m ²	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
			注射用水	2.5mL									
			生理食塩液	100mL									
3	CV	側管	ブスルフェクス	3.2mg/Kg	3時間かけて 調製後8時間以内に投与終了 ブドウ糖はブスルフェクスの10倍量にする					↓	↓		
			5%ブドウ糖	500mL									
4			TBI	1日2回 1回2Gy								↓	↓

1コース=8日間

～MEMO～

- ・ RIC(Reduced intensity conditioning) regimen
- 〈ブスルフェクス〉
- ・ブスルフェクスを、10倍量の生食、又は5%ブドウ糖液で希釈する。
- ・調整後は8時間以内に投与終了。
- ・痙攣予防として、フェニトインを内服する。(day-4～day0)
- (ex: アレビアチン(100) 3T/3x 毎食後)

〈フルダラ〉

- ・1vあたり 2.5mLの注射用水で溶解。