

科名 血液内科 血内131

対象疾患名 悪性リンパ腫

プロトコール名 (10分投与)トレアキシシ

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	21
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ	↓	↓		
2	点滴注	側管	グラニセトロンバック	1mg	30分かけて	↓	↓		
			デキサート	6.6mg					
3	点滴注	側管	トレアキシシ注	120mg/m ²	10分かけて	↓	↓		
			生食	50mL					

～MEMO～

2日間連日投与、19日間休薬 6コースまで

・トレアキシシによる治療中に高度の骨髄抑制、非血液毒性が認められた場合には、減量の目安により適切に休薬、減量or投与中止を考慮する。

なお、減量を行った場合には、以降投与量を維持し、増量しないこと。

前サイクル投与量120mg/m²の場合：90mg/m²に減量

前サイクル投与量90mg/m²の場合：60mg/m²に減量

前サイクル投与量60mg/m²の場合：投与中止

※リツキシマブ併用時は90mg/m²で計算する。

海外臨床試験 第2相SDX-105-01試験、第3相SDX-105-03試験

国内臨床試験 第1相2006001試験、第2相2007002試験

トレアキシシ点滴静注液100mg/4mLの10分間点滴静注投与時の安全性、忍容性を検討する第I/II相臨床試験