

科名 血液内科
 対象疾患名 移植前処置
 プロトコール名 VP16+CY+TBI

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
1	CV	側管	グラニセロンバッグ アロカリス	1mg 235mg	30分かけて			↓					
2	CV	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて	↓	↓		↓	↓↓	↓↓	↓↓	
3	CV	側管	エトポシド注	15mg/kg	3時間かけて シリンジポンプ	↓	↓						
4	CV	側管	エンドキサン 生理食塩液	60mg/kg 500mL	3時間かけて			↓	↓				
5	CV	側管	ウロミテキサン 5%ブドウ糖液	24mg/kg 50mL	30分かけて エンドキサン投与時			↓	↓				
6	CV	側管	ウロミテキサン 5%ブドウ糖液	24mg/kg 50mL	30分かけて エンドキサン投与 4時間後			↓	↓				
7	CV	側管	ウロミテキサン 5%ブドウ糖液	24mg/kg 50mL	30分かけて エンドキサン投与 8時間後			↓	↓				
8			TBI	1日2回 1回2Gy						↓↓	↓↓	↓↓	
9			移植										↓

1コース=8日間

～MEMO～

- ・催吐リスク(90%以上)
- ・エンドキサン 高齢者減量
- ・ウロミテキサンは、エンドキサンの40%量を1回量とする。
- ・day-3～-1のグラニセロンはTBIの各照射30分前より点滴静注(1日2回)