

科名 血液内科
 対象疾患名 再発・難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫又は未分化大細胞リンパ腫
 プロトコール名 アドセトリス

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	21
1	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	デキサート グラニセトロン	6.6mg 1mg	30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	アドセトリス 注射用水 生食	1.8mg/kg 1vに付10.5mL 50mL,100mL,250mL	1時間	↓						

★1クール=21日

～MEMO～

催吐レベル2(10%以上30%未満)

禁忌:ブレオマイシンを投与中の患者

Gr2の末梢神経障害発現の場合は休薬し、再開時は1.2mg/kgに減量すること。

1Vあたり10.5mLの注射用水で溶かす。

注射用水で希釈後、必要量を抜き取り、最終濃度が0.4-1.2mg/mLになるように希釈すること。

調製後の溶液は30分以上かけて投与する。急速投与は行わないこと。

投与30分前に、前処置としてアセトアミノフェン、ホララミンを内服し、インフュージョンリアクションに注意する。

初回は入院での実施が望ましい。