

科名 血液内科

対象疾患 急性骨髄性白血病、MDS

プロトコル名 AC→AZA（皮下注）

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	投与時間・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	…	28
	点滴注		グラニセロン注	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓											
1	皮下注		キロサイド	10 mg/m ²	朝	↓	↓	↓	↓	↓											
2	皮下注		キロサイド	10mg/m ²	夕	↓	↓	↓	↓	↓											
3	点滴注		アクラシノン 生食	14mg/m ² 100 mL	30分かけて	↓	↓														
4	内服	カイトリル細粒		投与1時間前に2mg1包内服									↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
or	点滴注		グラニセロン注	1mg	30分かけて																
6	皮下注		ビダーザ注 注射用水	75mg/m ² 1Vに付き4mL										↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

★1クール=28日

～MEMO～

キロサイド

1日2回投与（記載は1回量）

ビダーザ

・催吐レベル3（30～90％）

・ビダーザによる治療中に高度の骨髄抑制、非血液毒性が認められた場合には、減量の目安により、適切に休薬、減量or投与中止を考慮する。