

科名 血液内科

対象疾患 急性骨髄性白血病、MDS

プロトコル名 AC→AZA (静注)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	投与時間・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	…	28
1	点滴注	メイン	生食	500mL		↓	↓	↓	↓	↓											
2	点滴注		グラニセトロンパック	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓											
3	点滴注	側管	キロサイド 生食	20 mg/m ² 50mL	24時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓											
4	点滴注	側管	アクラシノン 生食	14mg/m ² 100 mL	30分かけて	↓	↓														
5	点滴注	メイン	生食	250mL	ルートキープ									↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
6	点滴注	側管	パロノセトロンパック	0.75mg	30分かけて									↓							
or																					
6'	点滴注	側管	グラニセトロンパック	1mg	30分かけて									↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
7	点滴注	側管	ビダーザ注 注射用水 生食	75mg/m ² 1VIにつき10mL 50mL	10分かけて									↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

★1クール=28日

～MEMO～

ビダーザ

- ・催吐レベル3(30～90%)
- ・7日間連日投与のうち5日間、21日間休薬
- ・ビダーザによる治療中に高度の骨髄抑制、非血液毒性が認められた場合には、減量の目安により、適切に休薬、減量or投与中止を考慮する。