

科名 血液内科
 対象疾患名 再発・難治性の多発性骨髄腫
 プロトコール名 KRd 2~12クール目

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | ... | 8 | 9 | ... | 15 | 16 | ... | 22 | ... | 28 |
|----|-----|-----|---------|---------------------|--------------------------|---|---|-----|---|---|-----|--------|----|-----|----|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン | 5%ブドウ糖 | 500mL | ルートキープ 残破棄可 | ↓ | ↓ | | ↓ | ↓ | | ↓ | ↓ | | | | |
| 2 | 点滴注 | 側管 | カイプロリス | 27mg/m ² | 10分かけて | ↓ | ↓ | | ↓ | ↓ | | ↓ | ↓ | | | | |
| | | | 注射用水 | 20mL | 投与開始1時間~30分前に 前処置薬を内服 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5%ブドウ糖 | 50mL | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口 | | レナリドミド | 25mg/body | | | | | | | | d1~d21 | | | | | |
| | 経口 | | デキサメサゾン | 40mg/body | カイプロリス投与 4時間~30分前 | ↓ | | | ↓ | | | ↓ | | | | | ↓ |

★1クール=28日

~MEMO~

催吐リスク(10%以上30%未満)

- ・妊婦・妊娠の可能性のある患者には禁忌
- ・必ず10分かけて点滴静注し、急速静注や10分未満の静脈内投与は避けること。
- ・必ずレナリドミド、デキサメサゾンと併用して使用すること。

レナリドミド: day1-21投与、7日間休薬。 デキサメサゾン: 40mg/bodyを day1,8,15,22 に投与。

- ・カイプロリス投与前1時間~30分前に前処置薬として、アセトアミノフェン0.5g/回、ホラミン(2)1T/回を内服すること。
- ・day2,9,16で、infusion reactionの発現リスクがある場合には、前投薬としてデキサメサゾン 4mg/回を追加することを検討する。
- ・体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積を2.2m²として投与量を算出。