

科名 血液内科
 対象疾患名 小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病
 プロトコール名 JALSG T-ALL211 SR 強化療法

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	8	9	10	11	12	...	15	...	22	23	24	25	26	...	28	
1	点滴注	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて																		
2	点滴注	側管	メソトレキセート 生食	500mg/m ² 100mL	30分かけて																		
3	点滴注	側管	メソトレキセート 生食	4500mg/m ² 500mL	23時間30分かけて																		
4	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 4時																		
5	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 10時																		
6	点滴注	側管	ソルコーテフ 生食	100mg 100mL	30分かけて																		
7	筋注		ロイナーゼ 5%ブドウ糖液	12500U/m ² 2mL																			
8	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 16時																		
9	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 22時																		
	内服		ロイケリン散	25mg/m ²	眠前																		
	髄注		大量MTX投与開始30分後以降から終了までに行う。																				

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	29	...	36	37	38	39	40	...	43	...	50	51	52	53	54	...	56	57	...	64
1	点滴注	側管	グラニセロンバッグ	1mg	30分かけて																				
2	点滴注	側管	メソトレキセート 生食	500mg/m ² 100mL	30分かけて																				
3	点滴注	側管	メソトレキセート 生食	4500mg/m ² 500mL	23時間30分かけて																				
4	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 4時																				
5	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 10時																				
6	点滴注	側管	ソルコーテフ 生食	100mg 100mL	30分かけて																				
7	筋注		ロイナーゼ 5%ブドウ糖液	12500U/m ² 2mL																					
8	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 16時																				
9	点滴注	側管	ロイコボリン 生食	15mg/m ² 50mL	30分かけて 22時																				
	内服		ロイケリン散	25mg/m ²	眠前																				
	髄注		大量MTX投与開始30分後以降から終了までに行う。																						

★1クール=64日

～MEMO～

催吐レベル3(30%以上90%未満)

《髄注量》

年齢 3歳以上に対し、「メソトレキセート 12mg、キロサイド 30mg、プレドニゾロン 10mg」を1本の注射器にまとめて髄注する。

メソトレキセートは、注射用蒸留水で溶解し、2.5mg/mLにする。プレドニゾロンは、注射用水に溶解し、10mg/mLにする。キロサイドは、必要量をシリンジにとる。

・ロイケリン散を25mg/m²を1日1回眠前にday1-56まで服用。