

科名 血液内科
 対象疾患名 Ph陽性急性リンパ性白血病
 プロトコール名 JALSG Ph+ ALL 213 地固め療法C2

| Rp | 形態 | ルート | 薬剤名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ... | 21 | 22 | ... | 29 |
|----|----|-----|------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|----|
| 1 | CV | 側管 | グラニセトロンパック | 1mg | 30分かけて | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CV | 側管 | エンドキサン 生理食塩液 | 1200mg/m ² 500mL | 3時間かけて | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CV | 側管 | ダウノマイシン 生理食塩液 | 45mg/m ² 100mL | 1時間かけて 壊死性抗がん剤 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CV | 側管 | オンコピン 生理食塩液 | 1.3mg/m ² 100mL | 30分かけて 壊死性抗がん剤 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経口 | | プレドニン | 60mg/m ² /日 | 1日3回 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | 経口 | | プレドニン | 30mg/m ² /日 | | | | | | | | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | |
| | 経口 | | プレドニン | 15mg/m ² /日 | | | | | | | | | | | ↓ | ↓ | | | | | | | | |
| | 経口 | | プレドニン | 5mg/m ² /日 | | | | | | | | | | | | | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | |
| | 経口 | | スプリセル | 100mg/body | 1日1回 朝食後 | | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ... | ↓ | ↓ | |
| | 髄注 | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1クール=29日

～MEMO～

催吐レベル3(30-90%)

オンコピンは最大 2mg

プレドニンは、20mg/m²/回を1日3回 day1-7まで内服する。その後、1週間かけて漸減終了する。

漸減方法は、30mg/m²/日 2日間→15mg/m²/日 2日間 →5mg/m²/日 3日間、とする。

髄注 メソトレキセート 15mg/body + デキササート注 3.3mg/body をday1に行う。

スプリセル 100mg/body をday2-22まで内服する。