

科名 血液内科
 対象疾患名 Ph陽性急性リンパ性白血病
 プロトコール名 JALSG Ph+ ALL 213 維持療法(非移植時)

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	27	28	...	35
1	点滴	メイン	生食	250mL	ルートキープ	↓																		
2	点滴	側管	グラニセトロンパッグ	1mg	30分かけて	↓																		
3	点滴	側管	オンコピン	1.3mg/m ²	30分かけて	↓																		
			生理食塩液	100mL	壊死性抗がん剤																			
	経口		プレドニン	60mg/m ² /日	1日3回	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓											
	経口		プレドニン	30mg/m ² /日									↓	↓										
	経口		プレドニン	15mg/m ² /日										↓	↓									
	経口		プレドニン	5mg/m ² /日												↓	↓	↓						
	経口		スプリセル	100mg/body	1日1回 朝食後	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	...	↓	↓	

1クール=35日

~MEMO~

- ・催吐レベル1(10%未満)
- ・オンコピンは、最大2mgまで。
- ・プレドニンは、20mg/m²/回を1日3回 day1-7まで内服する。その後、1週間かけて漸減終了する。
- ・漸減方法は、30mg/m²/日 2日間→15mg/m²/日 2日間 →5mg/m²/日 3日間、とする。
- ・スプリセル 100mg/body をday1-28(4週間)内服し、その後1週間休薬する。
- ・12コース実施する