

科名 血液内科
 対象疾患名 急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病
 プロトコール名 VP

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	点滴	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ	↓							↓						
2	点滴	側管	グラニセロン	1mg	30分かけて	↓							↓						
3	点滴	側管	オンコビン	1.4mg/m ²	30分かけて	↓							↓						
			生理食塩液	100mL	壊死性抗がん剤														
4		内服	プレドニン	40mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	点滴	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ	↓							↓						
2	点滴	側管	グラニセロン	1mg	30分かけて	↓							↓						
3	点滴	側管	オンコビン	1.4mg/m ²	30分かけて	↓							↓						
			生理食塩液	100mL	壊死性抗がん剤														
4		内服	プレドニン	40mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

1クール=28日間

～MEMO～

催吐レベル1(<10%)

オンコビン Max = 2 mg

プレドニン 40mg/m²/日を day1-28まで内服投与する。