

科名 血液内科
 対象疾患名 再発・難治性の多発性骨髄腫
 プロトコール名 Kd 2クール目以降

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	...	8	9	...	15	16	...	22	...	28
1	点滴注	メイン	5%ブドウ糖	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓	↓		↓	↓		↓	↓				
2	点滴注	側管	カイプロリス	56mg/m ²	30分かけて	↓	↓		↓	↓		↓	↓				
			注射用水	20mL	投与開始1時間～30分前に 前処置薬を内服												
			5%ブドウ糖	100mL													
	経口		デキサメサゾン	20mg/body	カイプロリス投与 4時間～30分前	↓	↓		↓	↓		↓	↓		↓	↓	

★1クール=28日

～MEMO～

催吐リスク2(10%以上30%未満)

- ・妊婦・妊娠の可能性のある患者には禁忌
- ・急速静脈内投与は行わないこと。
- ・デキサメサゾン:20mg/bodyを day1,2,8,9,15,16,22 ,23に投与。
- ・カイプロリス投与前1時間～30分前に前処置薬として、アセトアミノフェン0.5g/回、ホ®ラミン(2)1T/回を内服すること。
- ・day2,9,16で、infusion reactionの発現リスクがある場合には、前投薬としてデキサメサゾン 4mg/回を追加することを検討する。
- ・体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積を2.2m²として投与量を算出。