

科名 血液内科

対象疾患名 Ph陰性 B-ALL

プロトコール名 JALSG Ph(-) B-ALL213 C1,C4

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4
1	CV	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	
2	CV	側管	デキサート	33mg	1時間かけて	↓	↓	↓	
			5%ブドウ糖液	100mL					
3	CV	側管	キロサイド	2000mg/m ²	3時間かけて	↓	↓	↓	
			5%ブドウ糖液	500mL	朝 12時間毎				
4	CV	側管	エトポシド	100mg/m ²	1時間かけて	↓	↓	↓	
			生理食塩液	500mL	フィルター使用不可				
5	CV	側管	ソルコーテフ	100mg	30分かけて	↓	↓	↓	
			5%ブドウ糖液	50mL					
6	CV	側管	キロサイド	2000mg/m ²	3時間かけて	↓	↓	↓	
			5%ブドウ糖液	500mL	夕 12時間毎				
7	CV	側管	ロイナーゼ	10000KU/m ²	4時間かけて				↓
			5%ブドウ糖液	500mL					
8	髄注					↓			

～MEMO～

- ・催吐レベル3(30%以上90%未満)
- ・day1に「MTX 15mg/body+キロサイド[®] 40mg/body+デキサート注 3.3mg/body」(血内179)を髄注する。
<キロサイド>
- ・ステロイド点眼液を併用する
- ・60歳以上65歳未満の患者へ投与する場合は、1000mg/m²へ減量する。
<ロイナーゼ>
- ・筋注でも可。その際は、2mLの注射用水、または5%ブドウ糖液で溶解し使用する。
- ・60歳以上65歳未満の患者へ投与する場合は、5000KU/m²へ減量する。