

科名 血液内科

対象疾患名 Ph陰性 B-ALL

プロトコール名 JALSG Ph(-) B-ALL213 C2,C5

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CV	側管	グラニセトンバッグ	1mg	30分かけて	↓															↓					
2	CV	側管	メトトレキサート 5%ブドウ糖液	3000mg/m <sup>2</sup> 500mL	持続点滴 10時 24時間	↓															↓					
3	CV	側管	オンコビン 生理食塩液	1.3mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 壊死性抗がん剤 フィルター使用不可	↓															↓					
4	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 4時		↓	↓														↓	↓			
5	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 10時		↓	↓														↓	↓			
6	CV	側管	ロイナーゼ 5%ブドウ糖液	10000KU/m <sup>2</sup> 500mL	4時間かけて		↓															↓				
7	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 16時		↓	↓														↓	↓			
8	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	50mg 50mL	30分かけて 22時		↓															↓				
9	CV	側管	ロイコボリン 5%ブドウ糖液	15mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 22時		↓															↓				
10	経口		ロイケリン散	25mg/m <sup>2</sup>	1日1回 眼前	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
11	髄注					↓															↓					

～MEMO～

- ・催吐リスク3(30%以上90%未満)
- ・day1、15に「MTX 15mg/body+キロサイト<sup>®</sup> 40mg/body+テキサート注 3.3mg/body」(血内179)を髄注する。
- 〈メトトレキサート〉
- ・50歳以上の患者へ投与する場合は、1500mg/m<sup>2</sup>へ減量する。
- 〈オンコビン〉
- ・Max = 2 mg
- 〈ロイケリン散〉
- ・25mg/m<sup>2</sup>をday1-21に内服する。
- 〈ロイナーゼ〉
- ・筋注でも可。その際は、2mLの注射用水、または5%ブドウ糖液で溶解し使用する。
- ・60歳以上65歳未満の患者へ投与する場合は、5000KU/m<sup>2</sup>へ減量する。