

科名 血内科
 対象疾患名 Ph陰性 B-ALL
 プロトコール名 JALSG Ph(-) B-ALL213 維持療法

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破薬可	↓																													
2	点滴注	側管	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓																													
3	点滴注	側管	オンコピン 生理食塩液	1.3mg/m ² 100mL	30分かけて 壊死性抗がん剤 フィルター使用不可	↓																													
4	内服		ブレドニゾン	60mg/m ²		↓	↓	↓	↓	↓																									
5	内服		メトレキサート	20mg/m ²	分1 眠前 又は朝食後	↓							↓																						
	内服		ロイケリン散	60mg/m ²	1日1回 眠前	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

★1クール=28日

～MEMO～

- ・催吐レベル3(30%以上90%未満)
 - ・寛解導入療法開始日より満2年の日まで行う。
- 〈オンコピン〉
- ・Max = 2 mg
- 〈ブレドニゾン〉
- ・60mg/m²を day1-5に内服。
- 〈メトレキサート〉
- ・20mg/m²を、週1回、day1,8,15,22に 内服する。
- 〈ロイケリン散〉
- ・60mg/m² を day1-28 に内服。