

科名 血液内科

対象疾患名 慢性特発性血小板減少性紫斑病

プロトコール名 RTX(ITP)(初回)(400-600mgまで)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	7
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓		
2	点滴注	側管	リツキサン	100mg	25mL/1hr→50mL/1hr→100mL/1hr→ 150mL/1hr→200mL/hr	↓		
			生食	100mL	投与前1hr～30分前アセトアミノフェンとポラ ラミン内服			
3	点滴注	側管	リツキサン	mg	25mL/1hr→50mL/1hr→100mL/1hr→ 150mL/1hr→200mL/hr	↓		
			生食	500mL	投与前1h～30分前アセトアミノフェンとポラ ラミン内服			

1クールday7

～MEMO～

催吐レベル1(10%未満)

リツキサン1回投与量375mg/m² 4回まで

初回時投与速度は、25mL/hrより開始し、1時間後にinfusion reactionがなければ速度アップ可能。

投与開始時、流量変更時、および変更後15分にバイタル測定をすること。

リツキサン投与前1時間～30分前に前処置薬として、アセトアミノフェン0.5g/回とポララミン(2)1T/回を内服すること。