

科名 血液内科

対象疾患名 慢性特発性血小板減少性紫斑病

プロトコール名 RTX(ITP)(初回)(601-700mgまで)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	...	7
1	点滴注	メイン	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓		
2	点滴注	側管	リツキサ ン 生食	mg 250mL	25mL/hr→50mL/hr→100mL/hr→ 150mL/hr→200mL/hr 投与前1hr~30分前アセトアミノフェン とポララミン内服	↓		
3	点滴注	側管	リツキサ ン 生食	mg 500mL	25mL/hr→50mL/hr→100mL/hr→ 150mL/hr→200mL/hr 投与前1hr~30分前アセトアミノフェン とポララミン内服	↓		

1クールday7

~MEMO~

催吐レベル1(10%未満)

リツキサ1回投与量375mg/m<sup>2</sup> 4回まで

初回時投与速度は、25mL/hrより開始し、1時間後にinfusion reactionがなければ速度アップ可能。

投与開始時、流量変更時、および変更後15分にバイタル測定をすること。

リツキサ投与前1時間~30分前に前処置薬として、アセトアミノフェン0.5g/回とポララミン(2)1T/回を内服すること。