

科名 血液内科  
 対象疾患名 CD20陽性の濾胞性リンパ腫  
 プロトコール名 ガザイバ2サイクル目以降(1コース28日)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1 ... 28
1	点滴	メイン	生理食塩液	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓
2	点滴	側管	ガザイバ	1000mg	25mL/h→50mL/h→75mL/h →100mL/h 全量250mLにする	↓
			生理食塩液	210mL		

★1クール=28日

～MEMO～

催吐リスク 最小

トレアキシンと併用する。

<infusion reaction対策>

・前投薬は、前回grade3以上のinfusion reactionが無ければ、カロナール1000mgとポララミン2mgをガザイバ投与30分以上前に服用する。前回grade3以上のinfusion reactionが出現した場合は、初回投与に準じてデキサート注とカロナールとポララミンを前投薬する。

・2回目以降の投与は、前回Grade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合は、25mL/時で投与を開始し、infusion reactionが認められない場合は、30分ごとに25mL/時ずつ最大100mL/時まで上げることができる。

・ガザイバ調製方法:生理食塩液250mLから40mLをあらかじめ抜き、ガザイバ40mLを加え全量250mLにする