

科名 血液内科  
 対象疾患名 慢性活動性EBウイルス感染症  
 プロトコール名 ESCAP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	点滴注	側管	グラニセトロン	1mg	30分かけて	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	点滴注	側管	エトポシド 5%ブドウ糖	150mg/m <sup>2</sup> 500mL	2時間かけて 10:00～	↓								
3	点滴注	側管	ソルメドロール 5%ブドウ糖	62.5mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 9:30～		↓	↓	↓	↓				
4	点滴注	側管	キロサイド 5%ブドウ糖	1500mg/m <sup>2</sup> 500mL	3時間かけて 10:00～ 朝		↓	↓	↓	↓				
5	点滴注	側管	ソルメドロール 5%ブドウ糖	62.5mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 21:30～	↓	↓	↓	↓					
6	点滴注	側管	キロサイド 5%ブドウ糖	1500mg/m <sup>2</sup> 500mL	3時間かけて 22:00～ 夕	↓	↓	↓	↓					
7	点滴注	側管	プレドニゾン 5%ブドウ糖	30mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 13:30～					↓	↓	↓	↓	↓
8	点滴注	側管	ロイナーゼ 5%ブドウ糖	6000U/m <sup>2</sup> 500mL	1時間かけて 14:00～					↓	↓	↓	↓	↓

★1クール=9日

～MEMO～

<キロサイド>

・ステロイド点眼液を併用する

<ロイナーゼ>

初回プリックテストを行う。