

科名 血液内科

対象疾患名 全身性ALアミロイドーシス

プロトコール名 DCyBorD3-6クール

| Rp | 形態  | ルート | 薬品名    | 投与量                  | 時刻・コメント                      | 1 | 2 | ... | 8 | 9 | ... | 15 | 16 | ... | 22 | 23 | ... | 28 |
|----|-----|-----|--------|----------------------|------------------------------|---|---|-----|---|---|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|
| 1  | 皮下注 |     | ダラキューロ | 15mL/body            | 3-5分かけて<br>投与開始1-3時間前に前投薬を内服 | ↓ |   |     |   |   |     | ↓  |    |     |    |    |     |    |
| 1  | 皮下注 |     | ボルテゾミブ | 1.3mg/m <sup>2</sup> |                              | ↓ |   |     | ↓ |   |     | ↓  |    |     |    | ↓  |     |    |
|    |     |     | 生食     | 1.2mL                |                              |   |   |     |   |   |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 1  | 点滴注 | メイン | 生食     | 250mL                | ルートキープ<br>残破薬可               | ↓ |   |     | ↓ |   |     | ↓  |    |     |    | ↓  |     |    |
| 1  | 点滴注 | 側管  | エンドキサン | 300mg/m <sup>2</sup> | 30分かけて 上限500mg               | ↓ |   |     | ↓ |   |     | ↓  |    |     |    | ↓  |     |    |
|    |     |     | 生食     | 100mL                |                              |   |   |     |   |   |     |    |    |     |    |    |     |    |
|    |     |     | 又は     |                      |                              |   |   |     |   |   |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 1  | 経口  |     | エンドキサン | 300mg/m <sup>2</sup> | 上限500mg                      |   |   |     |   |   |     |    |    |     |    |    |     |    |
| 6  | 経口  |     | デカドロン  | 20mg/body            | ダラキューロ投与開始1-3時間前             | ↓ |   |     |   |   |     | ↓  |    |     |    |    |     |    |
| 7  | 経口  |     | デカドロン  | 20mg/body            |                              |   | ↓ |     |   |   |     | ↓  |    |     |    |    |     |    |
| 8  | 経口  |     | デカドロン  | 40mg/body            |                              |   |   |     | ↓ |   |     |    |    |     |    |    | ↓   |    |

★1クール=28日

~MEMO~

催吐リスク2(10%以上30%未満)

最長24クール

〈デカドロン〉総投与量として、週40mg/bodyを投与。

70歳を超える、又は過少体重(BMI:18.5kg/m<sup>2</sup>未満)の患者にはデカドロンを20mg/週で投与してもよく、ダラキューロ投与前に投与する。

〈ダラキューロ〉

初回投与時は点滴ルートを確認する

初回投与前に不規則抗体の測定を行うこと

慢性閉塞性肺疾患若しくは気管支喘息のある患者又はそれらの既往歴のある患者には、本剤の投与後処置として気管支拡張薬及び吸入ステロイド薬の投与を考慮。

《infusion reaction対策》

・infusion reaction軽減のため、ダラキューロ投与1-3時間前に解熱鎮痛剤および抗ヒスタミン剤を投与すること。

〈エンドキサン〉

体表面積に関わらず上限500mg